

Odběr stolice na parazitologické vyšetření:

Vzorek stolice na parazitologické vyšetření zhotoví pacient **odběrem** pomocí **dřívka** nebo **lopatičky** do příslušné odběrové zkumavky **3x obden**.

Velikost každého vzorku by měla být přibližně **jako vlašský ořech**.

Vzorky by neměly být kontaminovány vodou nebo močí.

Zkumavku, prosím popište jménem, datem a časem odběru.

První dva vzorky lze skladovat v lednici (nesmí zmraznout!) a doručit společně s **třetím** vzorkem, který by měl být **dodán čerstvý**, do **2 hodin od odběru**.

Pokud není možné dodat čerstvý vzorek, doručte co nejdříve od posledního odběru.

Adresa pro doručení:

Privátní mikrobiologická laboratoř Hradec Králové
Třída Edvarda Beneše 1549, HK 500 12
suterén, na konci chodby za čekárnou gastroenterologie
kontakt: +420495260361



Collection of stool specimens for parasite investigation:

Collection of stool specimen is carried out **using a wooden stick or shovel** into the appropriate container **3 times every other day** (e.g. on Monday, Wednesday and Friday).

The size of each sample should be about the **size of a walnut**. Please avoid contamination of samples with water or urine and write your name, the date and time of collection on each container. The first two samples could be stored in the fridge (do not freeze them!) and delivered with **the 3rd sample**, which should be delivered fresh within **2 hours after collection**. If it is not possible to deliver fresh sample, deliver all samples as soon as possible after last collection.

Address for delivery:

Privátní mikrobiologická laboratoř Hradec Králové
Třída Edvarda Beneše 1549, HK 500 12
basement, at the end of the corridor behind the gastroenterology waiting room
Phone n.: +420495260361



Odběr stolice na parazitologické vyšetření:

Vzorek stolice na parazitologické vyšetření zhotoví pacient **odběrem** pomocí **dřívka** nebo **lopatičky** do příslušné odběrové zkumavky **3x obden**.

Velikost každého vzorku by měla být přibližně **jako vlašský ořech**.

Vzorky by neměly být kontaminovány vodou nebo močí.

Zkumavku, prosím popište jménem, datem a časem odběru.

První dva vzorky lze skladovat v lednici (nesmí zmraznout!) a doručit společně s **třetím** vzorkem, který by měl být **dodán čerstvý**, do **2 hodin od odběru**.

Pokud není možné dodat čerstvý vzorek, doručte co nejdříve od posledního odběru.

Adresa pro doručení:

Privátní mikrobiologická laboratoř Hradec Králové
Třída Edvarda Beneše 1549, HK 500 12
suterén, na konci chodby za čekárnou gastroenterologie
kontakt: +420495260361



Collection of stool specimens for parasite investigation:

Collection of stool specimen is carried out **using a wooden stick or shovel** into the appropriate container **3 times every other day** (e.g. on Monday, Wednesday and Friday).

The size of each sample should be about the **size of a walnut**. Please avoid contamination of samples with water or urine and write your name, the date and time of collection on each container. The first two samples could be stored in the fridge (do not freeze them!) and delivered with **the 3rd sample**, which should be delivered fresh within **2 hours after collection**. If it is not possible to deliver fresh sample, deliver all samples as soon as possible after last collection.

Address for delivery:

Privátní mikrobiologická laboratoř Hradec Králové
Třída Edvarda Beneše 1549, HK 500 12
basement, at the end of the corridor behind the gastroenterology waiting room
Phone n.: +420495260361



Vyšetření na enterobiózu – Grahamova metoda (lepicí páska)

Pacient si **nesmí** před aplikací pásky **omývat konečník**.

Lepicí páska se přehrne přes okraj sklíčka a lepicí částí se **přitlačí k perianálním řasám řitního otvoru** kolmo na intergluteální rýhu.

Grahamovu metodu je vhodné provést ráno hned po probuzení, před stolicí a hygienou.

Pacient ideálně před přiložením pásky odtáhne hýždě od sebe, po nalepení je stlačí k sobě na několik vteřin a opět odtáhne. Po provedení použitou část pásky s obtiskem přilepí na podložní sklo a vyhladí pro minimalizaci bublinek. Odběr **opakovat 3x v intervalu 48hod**, všechny sklíčka dopravit do laboratoře.



Vyšetření na enterobiózu – Grahamova metoda (lepicí páska)

Pacient si **nesmí** před aplikací pásky **omývat konečník**.

Lepicí páska se přehrne přes okraj sklíčka a lepicí částí se **přitlačí k perianálním řasám řitního otvoru** kolmo na intergluteální rýhu.

Grahamovu metodu je vhodné provést ráno hned po probuzení, před stolicí a hygienou.

Pacient ideálně před přiložením pásky odtáhne hýždě od sebe, po nalepení je stlačí k sobě na několik vteřin a opět odtáhne. Po provedení použitou část pásky s obtiskem přilepí na podložní sklo a vyhladí pro minimalizaci bublinek. Odběr **opakovat 3x v intervalu 48hod**, všechny sklíčka dopravit do laboratoře.



Mikrobiologická PRIVÁTNÍ
LABORATOŘ
HRADEC KRÁLOVÉ

Vyšetření na enterobiózu – Grahamova metoda (lepicí páska)

Pacient si **nesmí** před aplikací pásky **omývat konečník**.

Lepicí páska se přehrne přes okraj sklíčka a lepicí částí se **přitlačí k perianálním řasám řitního otvoru** kolmo na intergluteální rýhu.

Grahamovu metodu je vhodné provést ráno hned po probuzení, před stolicí a hygienou.

Pacient ideálně před přiložením pásky odtáhne hýždě od sebe, po nalepení je stlačí k sobě na několik vteřin a opět odtáhne. Po provedení použitou část pásky s obtiskem přilepí na podložní sklo a vyhladí pro minimalizaci bublinek. Odběr **opakovat 3x v intervalu 48hod**, všechny sklíčka dopravit do laboratoře.



Mikrobiologická PRIVÁTNÍ
LABORATOŘ
HRADEC KRÁLOVÉ

Vyšetření na enterobiózu – Grahamova metoda (lepící páska)

Pacient si **nesmí** před aplikací pásky **omývat konečník**.

Lepící páska se přehrne přes okraj sklíčka a lepidlou částí se **přitlačí k perianálním řasám řitního otvoru** kolmo na intergluteální rýhu.

Grahamovu metodu je vhodné provést ráno hned po probuzení, před stolicí a hygienou.

Pacient ideálně před přiložením pásky odtáhne hýždě od sebe, po nalepení je stlačí k sobě na několik vteřin a opět odtáhne. Po provedení použitou část pásky s obtiskem přilepí na podložní sklo a vyhladí pro minimalizaci bublinek. Odběr **opakovat 3x v intervalu 48hod**, všechny sklíčka dopravit do laboratoře.



Vyšetření na enterobiózu – Grahamova metoda (lepící páska)

Pacient si **nesmí** před aplikací pásky **omývat konečník**.

Lepící páska se přehrne přes okraj sklíčka a lepidlou částí se **přitlačí k perianálním řasám řitního otvoru** kolmo na intergluteální rýhu.

Grahamovu metodu je vhodné provést ráno hned po probuzení, před stolicí a hygienou.

Pacient ideálně před přiložením pásky odtáhne hýždě od sebe, po nalepení je stlačí k sobě na několik vteřin a opět odtáhne. Po provedení použitou část pásky s obtiskem přilepí na podložní sklo a vyhladí pro minimalizaci bublinek. Odběr **opakovat 3x v intervalu 48hod**, všechny sklíčka dopravit do laboratoře.



Vyšetření na enterobiózu – Grahamova metoda (lepící páska)

Pacient si **nesmí** před aplikací pásky **omývat konečník**.

Lepící páska se přehrne přes okraj sklíčka a lepidlou částí se **přitlačí k perianálním řasám řitního otvoru** kolmo na intergluteální rýhu.

Grahamovu metodu je vhodné provést ráno hned po probuzení, před stolicí a hygienou.

Pacient ideálně před přiložením pásky odtáhne hýždě od sebe, po nalepení je stlačí k sobě na několik vteřin a opět odtáhne. Po provedení použitou část pásky s obtiskem přilepí na podložní sklo a vyhladí pro minimalizaci bublinek. Odběr **opakovat 3x v intervalu 48hod**, všechny sklíčka dopravit do laboratoře.

